

POUR DÉSHERBER VOS CÉRÉALES À L'AUTOMNE AVEC DU PROSULFOCARBE

# 2 conditions d'emploi

à respecter impérativement

Protéger les cultures non cibles

## Buses anti-dérive

Utiliser obligatoirement des buses à injection d'air homologuées « réduction des zones non traitées (ZNT) »



Pour vous aider à respecter les conditions d'emploi

### Quali'Cible

Un outil cartographique pour vous informer sur les conditions d'emploi des herbicides sur vos parcelles.\*\*  
[www.syngenta.fr/Quali-cible](http://www.syngenta.fr/Quali-cible)

### OptiBuse

Une appli pour vous aider à choisir les buses homologuées ZNT qui vous conviennent.

Dans un rayon de 1 km autour de cultures non cibles (CNC), ne pas appliquer le prosulfocarbe avant leurs récoltes.\*

\* Si impossibilité d'attendre la récolte et uniquement si la parcelle traitée est située à plus de 500 m de CNC, appliquer le prosulfocarbe avant 9h et après 18h (température faible et hygrométrie élevée).

1 km

### Cultures non cibles<sup>1</sup>



Cultures fruitières  
- pommes  
- poires



Cultures légumières  
- mâche  
- épinard  
- cresson des fontaines  
- roquette  
- jeunes pousses



Cultures aromatiques  
- cerfeuil  
- coriandre  
- livèche  
- menthe  
- persil  
- thym  
- aneth



Cultures médicinales  
- artichaut  
- bardane  
- cardon  
- chicorée  
- mélisse  
- piloselle  
- radis noir  
- sauge officinale  
- bourgeon de cassis



Autres cultures  
- sarrasin  
- quinoa  
- chia

\*\* Herbicides sélectifs grandes cultures et adjuvants de bouillie référencés dans Phytodata.

<sup>1</sup> Rapprochez-vous des agriculteurs voisins pour connaître les dates de récolte.