

PÂTURE-INFO N°3

La Chambre d'agriculture vous donne rendez-vous tous les quinze jours, pour **faire le point sur la pousse de l'herbe** afin de bien gérer l'utilisation de vos prairies et d'éviter les gaspillages. L'herbe pâturée est l'alimentation la plus économique à condition de l'utiliser au bon stade car sa qualité chute rapidement.

Voici les sommes de températures observées sur certains postes météorologiques du département, que vous pouvez retrouver via notre site en utilisant le lien ci-dessous: <http://www.tarn.chambagri.fr/a-votre-service/productions-animales/conseil-fourrages/bulletins-pature-info.html>.

Sans oublier le Paysan Tarnais de manière bi-hebdomadaire dans la rubrique « Pâture info ».

Stades phénologiques en fonction du type de prairie et pratiques à mettre en oeuvre

	Départ en végétation = mise à l'herbe	Epi à 10 cm du sol = fin du déprimage	Début épiaison = ensilage, enrubannage	Pleine épiaison = foin de qualité	Floraison = foin tardif, grossier
Prairie temporaire précoce, milieu fertile	250°Cj	500°Cj	750°Cj	850°Cj	950°Cj
Prairie permanente précoce, milieu fertile	300°Cj	600°Cj	850°Cj	1100°Cj	1200°Cj
Prairie permanente tardive, milieu moyennement fertile	450°Cj	900°Cj	1000°Cj	1250°Cj	1550°Cj
Prairie permanente tardive, milieu peu fertile	500°Cj	1000°Cj	1100°Cj	1400°Cj	1600°Cj

Depuis notre dernier rendez-vous du 21 mars, les conditions météorologiques sont restées toujours aussi printanières avec des températures élevées en journée mais sans pluie significative depuis près de deux mois. Ces conditions particulières ont limité la croissance de l'herbe qui a eu du mal à repartir suite à un premier pâturage, à ce stade il faut donc être vigilant à ne pas faire surpâturer les parcelles et il est recommandé d'appliquer un pâturage tournant dynamique sur les différents paddocks afin de ne pas y laisser trop longtemps les animaux. D'après la météo la pluie serait de retour espérons qu'elle sera en quantité suffisante pour permettre de bonnes repousses, le manque d'eau se faisait bien sentir.

Observons maintenant les températures de ces derniers jours

Cumul des moyennes des températures journalières du 1er février au 1^{er} avril 2019 (base 0-18°Cjour)

Stations météo observées

	Albi			Puycelci			Montredon Lab.			Mts de Lacaune*		
Altitude	172 m			260 m			566 m			800 m		
Année	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
T°C	602	407	551	585	370	531	531	293	522	425	192	408
<i>Normale</i>	478			457			376			298		

* avec station de Fraisse-Murat

En zone basse inférieure à 500 m les sommes de températures dépassent maintenant les 500°Cj et c'est le moment d'arrêter le déprimage pour les parcelles qui devront être fauchées. Les éleveurs ayant démarré dans les premiers jours de beau temps ont attaqué le deuxième tour.

Sur la zone intermédiaire (entre 500 et 800 m), nous observons pas ou peu de décalage avec la plaine car il a moins gelé.

Sur la zone haute autour des 800 m, le pâturage des premiers tours est en cours.

« ***Es pas jamai trop tard per plan faire*** »

Il n'est jamais trop tard pour bien faire.

A très bientôt d'ici quinze jours.

Jean-Bernard Mis

Bulletin rédigé avec le concours financier de l'Etat (CasDar)

AGRICULTURES & TERRITOIRES

Chambre d'agriculture du Tarn

Antenne ségala – 96, rue des agriculteurs

BP 89 - 81003 ALBI Cedex

Tél : 05.63.48.83.87 – Mobile : 06.43.31.72.56

Mail: jb.mis@tarn.chambagri.fr

Visitez notre site : www.tarn.chambagri.fr