

PÂTURE-INFO N°4

La Chambre d'agriculture vous donne rendez-vous tous les quinze jours, pour **faire le point sur la pousse de l'herbe** afin de gérer au mieux l'utilisation de l'herbe pâturée et d'éviter tant que possible le gaspillage. L'herbe pâturée est l'alimentation la plus économique à condition de l'utiliser à bon escient, car sa qualité évolue rapidement au cours de la saison. Ainsi, comme les années précédentes, vous trouverez dans les articles « **Pâture info** » qui paraîtront dans le Paysan Tarnais, l'évolution de la pousse de l'herbe au cours de la saison et les conduites à tenir. Vous retrouverez également ce bulletin sur le site de la Chambre d'Agriculture : <https://tarn.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/prairies-et-fourrages/bulletins-paturinfo/>

Les données de sommes de températures depuis le 1^{er} février pour ces 4 postes météo :

Cumul des moyennes des températures journalières du 1^{er} février au 11 avril 2022 (base 0-18°Cjour)

Stations météo observées

	Albi			Tanus			Montredon Lab.			Mts de Lacaune*		
Altitude	172 m			537 m			566 m			800 m		
Année	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
T°C	719	715	658	609	571	532	636	614	548	474	445	395
<i>Normale</i>	602			459			485			382		

* avec station de Fraisse-Murat

LES RÉCOLTES DÉMARRENT!



Les stades phénologiques du moment

	Mise à l'herbe	Fin du déprimage	Ensilage/enruban.
Prairie temporaire précoce	250°C jour	500°C jour	750°C jour
Prairie permanente fertile	300°C jour	550°C jour	850°C jour
Prairie permanente tardive	400°C jour	800°C jour	950°C jour
Prairie permanente peu fertile	450°C jour	900°C jour	1100°C jour

Après un week end hivernal début avril, les conditions printanières sont enfin revenus sur l'ensemble du département. Par contre, les sols sont très secs en surface avec des zones peu arrosées depuis l'épisode cévenol. Depuis 1 mois, le cumul de précipitations n'est que de 13 mm à Albi, 20mm à Tanus et 25mm à Montredon-Labessonnié ! On observe partout, malgré le retour de températures presque estivales, un fort ralentissement de la pousse de l'herbe. Dans ces conditions, attention à ne pas laisser les animaux sur-pâturer. En période de pousse très ralentie, il faut absolument sortir des parcs à hauteur de talon de botte (environ 5cm) pour ne pas pénaliser la repousse du 2^o passage.

Gare aux parcelles avec des hauteurs d'herbe à mi-botte (>20cm) car, même si elles restent appétentes, le gaspillage y est souvent important. Il est préférable de réserver ces surfaces pour la fauche voire envisager rapidement une fauche précoce pour, après repousse, les réintégrer dans votre tour de pâture.

En zone de plaine (<300m), les 700°jours sont atteints ce qui indique le début des récoltes précoces : ensilage et enrubannage. On privilégie la valeur alimentaire et la digestibilité avec, pour le Ray Grass italien, 0,9-0,95 UFL pour 160g de MAT par KgMS au détriment de la quantité, les rendements restant limités de 3 à 4TMS /ha.

Conseil sur la hauteur de fauche : la valeur des fourrages ne se trouvant jamais dans le talon, il est inutile de faucher ras !

Comme repère, on indique la largeur d'une main (réglage moyen de 7 à 8cm de haut.)

En zone plus intermédiaire (entre 300 et 600m), les 600°jours seront atteints cette semaine. Les déprimages sont finis pour toutes les parcelles réservées à la fauche sinon les rendements en seront limités.

Concernant le pâturage, le premier tour est terminé pour les mises à l'herbe précoces. La pousse n'étant pas encore dynamique, il est nécessaire actuellement d'ajuster la disponibilité des fourrages pour le troupeau : augmenter le rationnement à l'auge ou inclure de nouveaux paddocks dans votre second tour.

Dans les zones plus élevées (600 à 900m), avec 400°jours, les mises à l'herbe, après les quelques jours de froid glacial, peuvent enfin se généraliser. Les conditions de portance, avec l'Autan présent plusieurs jours, sont très bonnes et permettent d'envisager avec plus de sérénité les mises en pâture. Durant ces premières semaines, le foin doit être disponible en permanence dans les parcelles durant toute la période de transition alimentaire.

Par contre, les matinées fraîches ont fortement impacté les repousses des parcelles déjà pâturées. Pour éviter le risque de sur-pâturage, il faut limiter le temps de présence des animaux à l'herbe et augmenter la complémentation à l'auge.

Pour les zones les plus hautes (1000m), les 300°jours sont juste atteints.

Le retard est important par rapport aux dernières années. Mais, avec le redémarrage de la végétation, il faut prévoir, dès à présent, les premières mises à l'herbe sur ces secteurs plus tardifs.

À très bientôt d'ici quinze jours.

Alexis Gangneron