

La Chambre d'agriculture vous donne rendez-vous tous les quinze jours, pour **faire le point sur la pousse de l'herbe** afin de gérer au mieux l'utilisation de l'herbe pâturée et d'éviter tant que possible le gaspillage. L'herbe pâturée est l'alimentation la plus économique à condition de l'utiliser à bon escient, car sa qualité évolue rapidement au cours de la saison. Ainsi, comme les années précédentes, vous trouverez dans les articles « **Pâture info** » qui paraîtront dans le Paysan Tarnais, l'évolution de la pousse de l'herbe au cours de la saison et les conduites à tenir. Vous retrouverez également ce bulletin sur le site de la Chambre d'Agriculture : <https://tarn.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/prairies-et-fourrages/bulletins-paturinfo/>

Les stades phénologiques du moment

	Fin du déprimage	Ensilage/enruban.	Foin de qualité
Prairie temporaire précoce	500°C jour	750°C jour	850°C jour
Prairie permanente fertile	550°C jour	850°C jour	1100°C jour
Prairie permanente tardive	800°C jour	950°C jour	1250°C jour
Prairie permanente peu fertile	900°C jour	1100°C jour	1400°C jour

Rappel des repères de températures correspondant à une valorisation optimale de vos récoltes

Les données de sommes de températures depuis le 1^{er} février pour ces 4 postes météo :

Cumul des moyennes des températures journalières du 1^{er} février au 27 avril 2022 (base 0-18°Cjour)

Stations météo observées

	Albi			Tanus			Montredon Lab.			Mts de Lacaune*		
Altitude	172 m			537 m			566 m			800 m		
Année	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
T°C	973	898	864	834	747	722	857	775	738	652	566	581
Normale	816			646			675			550		

* avec station de Fraisse-Murat

Premiers chantiers de récolte

Un épisode pluvieux marqué a apporté des précipitations bienvenues sur l'ensemble du département. En 15 jours, on relève de 60 mm (Tanus, Albi) jusqu'à 110mm à Montredon-Labessonné. On observe une augmentation importante de la pousse de l'herbe. Sur certains secteurs, la végétation était déjà en stress hydrique ! Dans ces circonstances, les stades de développement progressent très rapidement et les prairies précoces sont déjà en début épiage.

Les sommes de températures sont presque au même niveau qu'en 2021 avec, en moyenne 3 jours de retard mais toujours en avance de 5 jours par rapport à la moyenne.

Il faut commencer à récolter les ensilages/enrubannages dès que possible. Les prairies destinées à être récoltées en foin devront également être surveillées. Les espèces précoces sont déjà épiées.

Le pâturage a profité des dernières pluies avec une forte augmentation de la pousse et la présence importante des trèfles. Attention au risque métabolique sur vos animaux surtout en phase de transition (entérotoxémie, météorisation).

En zone de plaine (<300m), les 900°jours seront atteints cette semaine. Les ensilages et enrubannages ont débuté avec des niveaux de sucre très satisfaisants (Brix de 10 à 12 %)

Quand faucher ? : préférez l'après-midi, la plante profite de l'ensoleillement et votre fourrage sera plus riche en sucre

Hauteur de coupe ? : fauchez à un réglage moyen de 7cm soit la largeur d'une main.

En fauchant plus ras, vous pénalisez la repousse du cycle suivant.

Attention au pâturage : risque important de se faire dépasser par la pousse. Faire le tour des parcs et débrayer ceux qui sont déjà à 20cm. À ce stade, l'herbe pâturée perd rapidement de son appétence. Si possible, récolter rapidement les parcelles concernées pour un retour possible des animaux 25 jours plus tard.

En zone plus intermédiaire (entre 300 et 600m), les 750°jours seront atteints dès le 01 mai. Les récoltes démarrent avec le retour de conditions idéales. Au stade début épiaison, on privilégie la qualité de l'ensilage ou de l'enrubannage. Les 1° coupes précoces anticipent de meilleures secondes coupes. Si la fenêtre météo est favorable, il ne faut pas hésiter à faucher.

Concernant le pâturage, le deuxième tour se termine avec des niveaux de pousse excédentaires. Il faut adapter la pression de pâturage sous peine de refus important ou réserver des parcs à la fauche. Dès que la hauteur de l'herbe dépasse les 18-20cm, à mi-mollet, il est préférable de récolter. L'enrubannage sera préféré en cas de surface réduite.



Dans les zones plus élevées (600 à 900m), avec 600°jours, les mises à l'herbe doivent être effectives pour toutes les parcelles de pâturage. Les taux de sucre relevés depuis le 20 avril sont déjà à des bons niveaux (Brix à 8 % en luzerne et dactyle et 10 % en brome et trèfle violet). Les déprimages sont terminés depuis 15 jours sous peine de forte dégradation des futurs rendements.

À très bientôt d'ici quinze jours.

Alexis Gangneron