

PÂTURE-INFOS

N°7

La Chambre d'agriculture vous donne rendez-vous tous les quinze jours pour **faire le point sur la pousse de l'herbe** afin de bien gérer l'utilisation de vos prairies et d'éviter les gaspillages. L'herbe pâturée est l'alimentation la plus économique à condition de l'utiliser au bon stade car sa qualité chute rapidement.

Voici les sommes de températures observées sur certains postes météorologiques du département, que vous pouvez retrouver via notre site en utilisant le lien ci-dessous: <https://tarn.chambreagriculture.fr/productionstechniques/elevage/prairies-et-fourrages/bulletins-paturinfo.html>

Sans oublier le Paysan Tarnais de manière bi-hebdomadaire dans la rubrique « Pâture-Infos ».

Stades phénologiques en fonction du type de prairie et pratiques à mettre en oeuvre

	Départ en végétation = mise à l'herbe	Epi à 10 cm du sol = fin du déprimage	Début épiaison = ensilage, enrubannage	Pleine épiaison = foin de qualité	Floraison = foin tardif, grossier
Prairie temporaire précoce, milieu fertile	250°Cj	500°Cj	750°Cj	850°Cj	950°Cj
Prairie permanente précoce, milieu fertile	300°Cj	600°Cj	850°Cj	1100°Cj	1200°Cj
Prairie permanente tardive, milieu moyennement fertile	450°Cj	900°Cj	1000°Cj	1250°Cj	1550°Cj
Prairie permanente tardive, milieu peu fertile	500°Cj	1000°Cj	1100°Cj	1400°Cj	1600°Cj

Depuis notre dernier rendez-vous de la mi-mai, la météo a été favorable à la pousse de l'herbe avec la pluie et les températures en hausse. Les chantiers de récolte battent leur plein quelque soit la zone, mais la météo est incertaine pour les premiers jours de cette semaine.

L'herbe dans ces conditions météorologiques est en forte croissance, il est donc impératif de maintenir une forte pression de pâturage, et de limiter les distributions à l'auge pour profiter au maximum de l'herbe sur pied.

- En zone basse (<600m), les sommes de températures relevées nous indiquent que les graminées des prairies permanentes sont en pleines floraison, et c'est donc le moment de faire les foins. Rien ne sert d'attendre après la qualité chutera très rapidement.
- Sur la zone intermédiaire (>600m et <800m), les fauches précoces destinées à bénéficier d'un fourrage de qualité sont sur leur fin, car les épis sont là. Seules les prairies permanentes tardives méritent encore de se récolter sous forme d'enrubannage ou d'ensilage. C'est également le bon stade pour récolter les méteils fourragers (floraison des protéagineux).
- Sur les zones d'altitude du département (entre 800 et 1000 m), nous sommes encore sur une période idéale pour réaliser les premières récoltes

de qualité sur des prairies temporaires précoces.

Observons maintenant les températures de ces derniers jours

Cumul des moyennes des températures journalières du 1^{er} février au 31 mai 2021 (base 0-18°Cjour)

Stations météo observées

	Albi			Puycelci			Montredon Lab.			Mts de Lacaune*		
Altitude	172 m			260 m			566 m			800 m		
Année	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
T°C	1341	1544	1380	1295	1502	1325	1175	1383	1194	943	1124	939
Normale	1354			1288			1140			914		

* avec station de Fraisse-Murat

Une année qui reste en retard à celle de l'an passé, mais assez proche de la normale, vu l'évolution des températures de ces derniers jours.

«Se plou per la Sant Medard (8/6), quarant jorns i dura,al mens que Bernabèu (11/6) i copa lo pè. »

S'il pleut à la Saint Médard, quarante jours cela dure, à moins que Barnabé ne lui coupe le pied.

A très bientôt d'ici quinze jours.

Jean-Bernard Mis

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

Liberté
Égalité
Fraternité