

# PÂTURE-INFO N°7

La Chambre d'agriculture vous donne rendez-vous tous les quinze jours, pour **faire le point sur la pousse de l'herbe** afin de bien gérer l'utilisation de vos prairies et d'éviter les gaspillages. L'herbe pâturée est l'alimentation la plus économique à condition de l'utiliser au bon stade car sa qualité chute rapidement.

Voici les sommes de températures observées sur certains postes météorologiques du département, que vous pouvez retrouver via notre site en utilisant le lien ci-dessous: <http://www.tarn.chambagri.fr/a-votre-service/productions-animales/conseil-fourrages/bulletins-pature-info.html>.

Sans oublier le Paysan Tarnais de manière bi-hebdomadaire dans la rubrique « Pâture info ».

## Stades phénologiques en fonction du type de prairie et pratiques à mettre en oeuvre

	Départ en végétation = <b>mise à l'herbe</b>	Epi à 10 cm du sol = <b>fin du déprimage</b>	Début épiaison = <b>ensilage, enrubannage</b>	Pleine épiaison = <b>foin de qualité</b>	Floraison = <b>foin tardif, grossier</b>
Prairie temporaire précoce, milieu fertile	250°Cj	500°Cj	750°Cj	850°Cj	950°Cj
Prairie permanente précoce, milieu fertile	300°Cj	600°Cj	850°Cj	1100°Cj	1200°Cj
Prairie permanente tardive, milieu moyennement fertile	450°Cj	900°Cj	1000°Cj	1250°Cj	1550°Cj
Prairie permanente tardive, milieu peu fertile	500°Cj	1000°Cj	1100°Cj	1400°Cj	1600°Cj

Depuis notre dernier rendez-vous du 30 avril, nous avons vécu un épisode de chaleur avec du vent d'Autant, puis un retour à la fraîcheur et surtout à la pluie (plus de 100 millimètres dans de nombreux endroits) depuis le début de cette semaine. Pâturage et récoltes sont à l'arrêt en attendant des jours meilleurs.

L'année reste toujours aussi précoce avec suivant les sites plus de 15 jours d'avance par rapport à la normale.

Observons maintenant les sommes de températures de ces derniers jours

### Cumul des moyennes des températures journalières du 1er février au 11 mai 2020 (base 0-18°Cjour)

#### Stations météo observées

	Albi			Puycelci			Montredon Lab.			Mts de Lacaune*		
Altitude	172 m			260 m			566 m			800 m		
Année	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
T°C	976	1039	1206	912	1002	1170	784	922	1067	609	725	831
Normale	1011			969			835			653		

\* avec station de Fraisse-Murat

- En zone basse (<600m), les sommes de températures atteignent le seuil des 1200°Cj cumulées depuis le 1er février (cf tableau de dessus), l'heure est maintenant propice aux récoltes de foin si la météo de ces prochains

jours le permet.

- Sur la zone intermédiaire (>600m et <800m), dès que la météo deviendra favorable, il sera nécessaire de terminer les chantiers de récolte d'enrubannage pour les prairies naturelles.
- Sur les zones d'altitude du département (entre 800 et 1000 m), on dépasse le seuil des 800°Cj sur les prairies temporaires c'est donc les récoltes de type enrubannage ou ensilage qui sont d'actualité.

Suite à ces dernières pluies, si le temps se lève, la croissance des plantes va être soutenue, faites attention à ne pas vous faire dépasser. Rappelez-vous que le meilleur moment pour faucher vos prairies à base de graminées, est le début de l'après-midi car à ce moment-là de la journée, elles auront accumuler un maximum de sucre.

**« Al mes de mai, la calor fa pas de tot la valor »**

Au mois de mai, la chaleur ne fait pas de tout la valeur

A très bientôt d'ici quinze jours.



Action cofinancée par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) et le Compte d'Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural (CasDAR)

L'Europe investit dans les zones rurales