

Retour en images... Les tournées de parcelles de Prairies à Flore Variée

Les groupes Capflor Ségala et Qualiprat + ont réalisé ce printemps des tournées de parcelles de PFV avec Vladimir Goutiers de l'INRAE de Toulouse. Retour en images sur quelques observations...

Groupe Capflor Ségala

5 mai 2021



Padies chez Gilles Arnal

PFV de fauche implantée à l'automne 2019, milieu fertile mais pauvre en phosphore.

Espèces implantées : RGH, brome, dactyle, féтуque élevée, pâturin des prés, luzerne, TV.

Fort développement des graminées au détriment des légumineuses du fait d'un apport régulier de lisier de porcs. Bonne productivité (autour de 7 TMS/ha en 2019).

Andouque chez Etévenon Martin

PFV mixte riche en chicorée et plantain associée à de la féтуque élevée, du RGA, du RGH, du pâturin et du TB et de la luzerne.

Bonne implantation, productive (7 TMS/ha en 2019). Utilisation en fauche puis pâturage des vaches.



Moulares chez Bonnet Josian

PFV à base de festulium, de féтуque élevée et féтуque rouge, de pâturin des prés, de RGH et RGA associés à de la luzerne, du lotier et du TB.

Présence de chicorées non prévues au départ (erreur lors du mélange effectué à la ferme).

Bonne implantation, couvert dense valorisé par les poules pondeuses (parcours).

Valdéries chez Massié Frédéric

PFV de type mixte à base festulolium, de fétuque élevée, de pâturin des prés, de RGH, associés à de la luzerne, du TB, du TV et du plantain.

Semis d'automne non favorable au développement de la luzerne (peu présente). Parcelle très productive (10-12 TMS/ha/an). Fertilisation régulière à base de lisier de bovins. Plantain très présent.



12 mai 2021

Valdéries

PFV pâture à base de RGA, RGH, de festulolium, de fétuque élevée, fétuque rouge, pâturin des prés, associées à du TB, du lotier, de la chicorée et du plantain.

Bonne implantation, productivité et appétence.

Terre de Bancalié chez Pierre Robert

PFV de fauche semée le 19/09/2019 - 2^{ème} année d'exploitation - Enrubannage fait au 08/05
Espèces implantées :RGH, TB, Luzerne, Dactyle, fétuque, Brome, plantain.

Absence de luzerne, plantain, brome -> Problème à l'implantation. Préférer le printemps pour la luzerne et le plantain. Brome à semer + profond.





Terre de Bancalié chez Pascal Caillol

PFV de fauche semée le 15/10/2019 - 2^{ème} année d'exploitation - Sursemis réalisé automne 2020 car craintes absence de MS (avoine/vesce)
Espèces implantées : RGH, TB, trèfle violet, Luzerne, Dactyle, fétuque élevée, fétuque rouge, Brome,

Absence luzerne, brome, TV. Prédominance RGH et TV -> Problème à l'implantation. Fauches non réalisées au bon stade -> légumineuses étouffées, graminées non tallées.

Cambon chez Jean-François Michel

PFV de fauche semée à l'automne 2019.

Pas encore fauchée au 12/05.
Espèces implantées : RGH, TB, trèfle violet, Luzerne, Dactyle, paturin, fétuque élevée, brome, plantain.

Beau peuplement mais absence luzerne -> Fauche à réaliser plus précocement.



Brens chez Jean-Pierre AZEMAR

PFV de pâture 100% typée été.

Implantation sept 2020
Espèces implantées : RGA, TB, lotier, Dactyle, Paturin, fétuque élevée, chicorée, plantain.

Peuplement bien représentatif. Attention au surpâturage surtout les 1ères années d'implantation (fragilise la prairie) -> Diminuer la pression des animaux

Groupe Qualiprat+ Visites du 10 juin 2021

Anglès au GAEC du Rodier

PFV de pâture implantée à l'automne 2017.

5^{ème} tour de pâture de l'année. Utilisation du topping pour gérer l'épaison.

Espèces implantées : RGH, RGA, TB, trèfle de Micheli, luzerne, lotier, pâturin des prés, fétuque élevée, festulolium, fétuque rouge, chicorée et plantain.

Couvert dense. Seule la luzerne est peu présente. Parcelle productive et appétente.



Anglès au GAEC du Rodier

PFV de fauche intermédiaire implantée au printemps 2017.

1^{ère} coupe à venir quelques jours après la visite.

Espèces implantées : RGA, TB, luzerne, pâturin des prés, fléole, fromental.

Fléole en début d'épaison, fromental épié. Bonne production. Permet des récoltes plus tardives en conservant de la qualité.



Anglès au GAEC de Peyrembert

PFV de pâture précoce implantée ce printemps en semis croisé.

Espèces implantées : RGH, RGA, TB, luzerne, lotier, pâturin des prés, fétuque élevée, festulolium, fétuque rouge, chicorée et plantain.

Parcelle très propre, espèces bien implantées. C'est vraiment le type de semis à privilégier !



Anglès au GAEC de Peyrembert

PFV de pâture pour le lot d'agnelles implantée au printemps 2018.

Espèces implantées : RGI, RGA, TB, lotier, dactyle, pâturin des prés, fétuque élevée, fétuque rouge et plantain.

Les premières années, le plantain paraissait peu consommé, ce n'est plus du tout le cas. Fertilité un peu limitée et surement du surpâturage qui ont conduit à l'éclaircie du couvert.

Anglès au GAEC de Lamarque

PFV de pâture implantée ce printemps..

Espèces implantées : RGH, RGA, TB, luzerne, lotier, pâturin des prés, fétuque élevée, festulolium, fétuque rouge, chicorée et plantain.

Semis en ligne un peu colonisé par les adventices. Une fauche de nettoyage est préconisée lorsque le lotier aura atteint 8 à 10 cm de hauteur. Le pâturage de la première année doit être modéré pour permettre au couvert de s'installer.



Anglès au GAEC de Lamarque

PFV de pâture implantée à l'automne 2018

Espèces implantées : RGH, RGA, TB, luzerne, lotier, pâturin des prés, fétuque élevée, festulolium, chicorée et plantain.

Parcelle qui est montée pendant le pic de pousse et qui est à présent trop haute pour la pâture. A réserver à la fauche.



Le Rialet au GAEC de Bonherbe

PFV de pâture implantée à l'automne 2019

Espèces implantées : RGH, RGA, TB, trèfle de Micheli, luzerne, lotier, dactyle, pâturin des prés, fétuque élevée, fétuque des prés, fétuque rouge, festulolium, chicorée et plantain.

Parcelle qui est montée pendant le pic de pousse et qui est à présent trop haute pour la pâture. A réserver à la fauche.

Bon équilibre du mélange. 5^{ème} tour de pâture pour cette année.



Quelques conseils suite aux différentes observations des mélanges :

- Soigner au maximum l'implantation :
 - Semer la luzerne au printemps en l'inoculant pour maximiser les chances de réussite.
 - Semer le brome à part comme une céréale (grosse graine qui a besoin de plus de profondeur que les autres graminées prairiales).
 - Semer en croisé pour une meilleure répartition des graines (limitation de la concurrence et de la colonisation par les adventices)
- Une bonne conduite de la parcelle est primordiale : mise à l'herbe, temps de retour, chargement, type d'utilisation, date de fauche... tout cela influe sur l'équilibre des espèces dans le mélange.
- Visuellement des plantes paraissent parfois dominer, leur port y est pour beaucoup (chicorée, plantain).
- Les animaux sont parfois réticents à manger de nouvelles plantes mais cela ne dure pas.
- Le mélange met jusqu'à un an à s'équilibrer, patience !
- Les mélanges de fauche intermédiaire ou tardive peuvent être une opportunité pour avoir un fourrage de qualité avec une récolte plus tardive.

Jean-Bernard Mis et Caroline Auguy

Juin 2021