



# GIEE QualiPrat + 2021-2023

## Retours d'expériences sur le pâturage tournant

Des suivis pâturage ont eu lieu dans le cadre du GIEE QualiPrat +. Voici le retour de 5 exploitations suivies.

### Présentation des exploitations

	Type et nombre d'animaux	Surface de pâture au printemps	Chargement Ares/ UGB	Parcellaire
<b>GAEC du Rodier</b> – BL Bio et transformation fromagère	48 VL	27 ha	56	Groupé autour de l'exploitation
<b>GAEC de Caunan</b> – BV veaux sous la mère	45 VA	15 ha	33	Morcelé et départementale à traverser
<b>GAEC de Vié</b> - OL	340 brebis	22 ha	38	Groupé autour de l'exploitation
<b>GAEC de Trévi</b> - OL	445 brebis	28 ha	37	Groupé autour de l'exploitation
<b>Gaël BENOIT</b> – BV bio	2 lots : 12 et 36 vaches + veaux	7 et 15 ha	44 et 32	Morcelé en plusieurs îlots


## Qu'est-ce qui a changé depuis la mise en place du pâturage tournant ?

### GAEC du Rodier – BL – Pâturage tournant depuis 2017

Beaucoup de choses ! On a augmenté la surface à disposition des vaches au printemps et réduit le temps de présence sur les parcelles à 1 j. Avant, les vaches restaient environ 3 jours puis les génisses prenaient la suite pour 3 jours supplémentaires. Du coup, on a des temps de retours sur les parcelles plus importants. Les parcelles sont découpées et on tourne toute la saison alors qu'on donnait au fil avant à partir de l'été.

On arrive à mettre à l'herbe un mois plus tôt et à rentrer les animaux 15 jours plus tard en hiver.

La part d'herbe pâturée dans la ration a fortement augmentée, on est passé de 50% de ration à l'auge à 0% pendant la pleine pousse de l'herbe. Elles passent 18h/24h au pâturage au printemps contre 6h avant la mise en place du pâturage tournant.



**PLUS DE SURFACE – REDUCTION DU TEMPS DE PRESENCE – PLUS DE TEMPS AU PATURAGE – PLUS D'HERBE PATUREE DANS LA RATION**



### GAEC de Caunan – BV - Pâturage tournant depuis 2019

On a réduit la surface à disposition au printemps de 5 ha pour le même nombre de vaches. On est passé du pâturage au fil ou sur des parcelles entières à des paddocks de 1 à 2 jours. Du coup chaque parcelle dure plus longtemps.



**AUGMENTATION DU CHARGEMENT – PLUS DE TEMPS SUR CHAQUE PARCELLE**

### GAEC de Vié – OL – Pâturage tournant depuis 2021

On pâture déjà à 1 jour par parcelle mais on a redécoupé des parcelles qui n'étaient pas homogènes. En les « forçant » à aller sur les endroits moins appréciés, on a beaucoup moins de refus. On fait aussi plus attention aux temps de retours sur les parcelles en été. On donne moins de foin en complément quand les brebis sont au pâturage, la plupart du temps, elles ne le mangent pas. Ça doit aussi être dû à la valeur des PFV que l'on a introduites en même temps dans la sole de pâture.



**MOINS DE REFUS – TEMPS DE RETOUR PLUS LONG EN ETE - MOINS DE COMPLEMENTATION**

### GAEC de Trévi – OL – Pâturage tournant depuis 2021



Au printemps, avec 3 ha de plus, on arrive à faire pâturer 100 brebis supplémentaires ! Avant, on avait une belle pousse sur le printemps puis plus rien. En été, on double quasiment la surface pâturée en ajoutant des parcelles fauchées en 1ère coupe.

On mettait les brebis à l'herbe au premier rayon de soleil et il nous arrivait de nous retrouver sans herbe à la fin du 1er tour. Maintenant, on attend les 250° jours et on commence par pâturer des couverts ou des céréales si elles sont proches des bâtiments.

On a redécoupé les parcelles pour ne laisser les brebis qu'un jour. Du coup, l'herbe est de meilleure qualité et on ne donne du foin que pour aider à la rumination et

l'aliment en été sert surtout à faire monter les brebis en salle de traite !



**AUGMENTATION DU CHARGEMENT – PATURAGE PLUS LONGTEMPS – MISE A L'HERBE RECALEE – MOINS DE COMPLEMENTATION**

Avec le soutien financier de



## Gaël Benoit – BV - Pâturage tournant depuis 2021

On fait pâturer 10 vaches de plus sur la même surface, je ne pensais pas que c'était possible. On sort les animaux 15 jours plus tôt au printemps. On est passé de 5-6 jours par parcelle à 3 jours par paddocks.

 **AUGMENTATION DU CHARGEMENT – MISE A L'HERBE PLUS PRECOCE**



### Les effets constatés sur les animaux

- Les animaux vont plus facilement sur les parcelles
- Augmentation de la **production laitière** en plein pousse de l'herbe. Les vaches ont les pis plus gonflés qu'avant et le GMQ s'est amélioré, les veaux partent 15 jours plus tôt.
- Les animaux sont plus **calmes**, habitués à avoir de l'herbe de qualité tous les jours.
- Nette diminution des **frais vétér** par rapport à la ration à base de maïs ensilage toute l'année.



### Les effets constatés sur les prairies

- Moins de **refus** et meilleure repousse au tour suivant
- Augmentation de la **durée de vie** des prairies
- Augmentation du **rendement** si on ne surpature pas
- Augmentation de la **valeur alimentaire** des prairies (plus de légumineuses, prairies plus diversifiées)
- Augmentation de la **fertilité** grâce à l'augmentation du chargement et des restitutions au pâturage.

## Quels aménagements avez-vous fait et pour quel coût ?

Les réponses varient selon les exploitations, avec des aménagements variables classés ici par ordre de simplicité de mis en place.

- Simple redécoupage de parcelles avec des clôtures mobiles.
- Création de couloirs dans les grandes parcelles pour ne pas repasser par les paddocks pâturés.
- Création de chemins d'accès
- Mise en place d'un réseau d'abreuvement avec des tuyaux enterrés

Le coût pour la mise en place des **clôtures** varie de 0 € (reprise de fils et piquets présents sur l'exploitation) à 115€ /ha pour des redécoupages de grandes parcelles. La moyenne est à **50€/ha**.

2 agriculteurs ont mis en place un **réseau d'abreuvement** avec des tuyaux enterrés et des bacs. Le coût est respectivement de **41€/vache et 146€/vache**. La différence vient de la disposition des parcelles entre elles, de la longueur des tuyaux et de la possibilité de mettre un bac pour plusieurs paddocks.

## Quel a été l'impact sur le temps de travail ?

Pour la mise en place en début de saison, le temps est estimé à **1 à 2 jours par exploitation** suivant la taille et la disposition des parcelles.

**Un gain de temps est unanimement constaté pendant la saison de pâturage :**

- Pour amener les animaux au pâturage, les animaux y vont quasiment seuls
- Pour choisir la prochaine parcelle, on suit quasiment toujours le même circuit
- Pour distribuer la complémentation, diminution voire arrêt pour certains en pleine pousse de l'herbe
- Pour changer de paddock : les animaux sont habitués et viennent dès qu'ils entendent le quad.

Avec le soutien financier de



## Les avantages du pâturage tournant

- **Simplicité** du système une fois qu'il est mis en place, même une personne qui n'est pas habituée à mettre les animaux au pâturage pourra le faire, il suffit de suivre le planning.
- Meilleure **valeur alimentaire** de l'herbe pâturée, les animaux ont toujours de l'herbe appétente
- Meilleure **qualité des fromages** constatée
- Gain en **autonomie alimentaire** : on utilise moins de foin et d'aliment
- L'augmentation possible du chargement sur les parcelles permet de dégager des **surfaces supplémentaires pour la fauche**



## Les inconvénients du pâturage tournant

2 des 5 exploitants n'en voient aucun.  
Pour les autres :

- Le système amplifie la différence entre les « bonnes » et « moins bonnes » parcelles. **La production monte et descend suivant les parcelles**
- Le **stress à la mise en place du système** qu'il n'y ait pas assez herbe vu que l'on augmente le chargement
- La nécessité d'avoir des **parcelles « de rechange »** si l'on rate un semis. Le tour est à alors à revoir.

## Des conseils pour ceux qui veulent se lancer ?

Nicolas CROS - GAEC de Trévi

« Prenez le temps de réfléchir en amont à la surface nécessaire, au découpage et aux points d'accès »

Romain BIAU - GAEC de Caunan

« Attention au surpâturage, on peut perdre 1 à 2 semaines de pousse en râpant trop. Et faites-vous accompagner au début, ça sera plus facile. »

Nicolas ROUQUETTE - GAEC de Vié

« Ne divisez pas tout d'un coup, allez-y petit à petit. Avoir une sole dédiée au pâturage, ça aide ! »

Sébastien DUBOCHAUD - GAEC du Rodier

« Les 2 premières choses à faire : arrêter le surpâturage et les fauches trop rases ! Une prairie doit toujours rester verte pour produire. »

Gaël BENOIT

« N'ayez pas peur, vous ne le regretterez pas ! Le découpage initial peut évoluer, il faut partir sur des clôtures mobiles. Commencez sur une petite surface, sur un petit lot, sur des taries par exemple.

Pour gagner du temps au printemps, j'ai repéré quels fils allaient pour quelle parcelle et je laisse des piquets bois pour repérer les points de découpage. »

**Caroline AUGUY**

Conseillère fourrages et animatrice du GIEE QualiPrat +

Avec le soutien financier de