

Day	Min	Max	Precip
MER 06	16	31	0
JEU 07	14	29	0
VEN 08	15	30	0
SAM 09	15	32	0
DIM 10	17	34	0
LUN 11	18	34	0

## Cette semaine :

- **Données météorologiques**
- **Black-rot**
- **Mildiou**
- **Oïdium**
- **Vers de la grappe**
- **Cicadelle verte**
- **Flavescence dorée**
- **Mesures agro-écologiques**
- **Divers**

## Stades phénologiques



Le stade "fermeture de la grappe" est atteint en toutes situations. Aucun signe de véraison n'est signalé à ce jour. Nous nous situons sur une année précoce, comparable à 2020 où la véraison a débuté vers le 7 juillet.

"Fermeture de la grappe" sur Fer servadou.

## DONNEES METEOROLOGIQUES

### Météorologie:

Pour la semaine dernière, les cumuls de pluie sont compris entre 7 et 15 mm, selon les secteurs. Les pluies orageuses du lundi 4 juillet ont été accompagnées de quelques impacts de grêle, en particulier sur les secteurs de Sainte Cécile d'Avès, de Noailles et de Sainte Croix. Les cumuls de lundi varient entre 0 et 5mm. La semaine en cours s'annonce sèche et les températures estivales.

## BLACK-ROT

### Analyse de risque

#### Observations:

Cette semaine, les symptômes n'ont pas progressé, ni sur les témoins non traités ni au vignoble.

#### Analyse de risque:

A partir du stade "fermeture de la grappe" la sensibilité des baies diminue, toutefois en présence de symptômes sur grappes, restez vigilants, jusqu'à la "véraison".

### Préconisations

**La semaine en cours s'annonce sèche. En l'absence de pluie aucune contamination n'est possible.**

Les produits à base de soufre ne sont pas homologués mais ont une efficacité secondaire démontrée à 8 kg/ha.



Black-rot sur baies

## A retenir

Aucune pluie n'est annoncée, les traitements sont inutiles.

## MILDIU

## Analyse de risque

**Observations:**

Quelques sorties de taches récentes sont ponctuellement signalées au vignoble, elles sont localisées sur le haut du feuillage. En revanche, aucun nouveau symptôme n'est recensé sur grappes.



Mildiou sur feuille

**Modélisation:**

Des contaminations pré-épidémiques ont été modélisées le 27 juin. Les symptômes issus de ces contaminations devraient être visibles.

Les cumuls nécessaires pour déclencher des contaminations épidémiques sont compris entre 3 et 25 mm, selon les secteurs.

## Préconisations

**La semaine en cours s'annonce sèche, en l'absence de pluie aucune contamination n'est possible. Attention sur les parcelles avec présence de taches, des repiquages sont possibles, lors des rosées matinales.**

\* Bouillie bordelaise RSR Disperss, Frégate SC, Kocide 35 DF, Hélocuivre, Cuproxat SC, ChampFlo Ampli, sont des spécialités à base de cuivre.

La dose de cuivre métal à prévoir :  
\* 200g/ha

Attention le nombre d'application maximum des produits à base de cuivre varie selon les spécialités.

**Alternatives**

Mise en oeuvre de la prophylaxie.

**A retenir**

Aucune pluie n'est annoncée, les traitements sont inutiles sur parcelles saines.

## OIDIUM

## Analyse de risque

**Observations:**

Cette semaine les symptômes sont plus présents sur les témoins non traités et sur les parcelles sensibles de Gamay, Chardonnay, Merlot, Duras, Muscadelle et Syrah.

**Analyse de risque:**

Sur les parcelles saines, la phase de sensibilité est terminée.



Oïdium sur grappe, Muscadelle

## Préconisations

**Restez vigilants jusqu'à la "véraison" sur les parcelles où vous constatez une sortie de symptômes. Sur les parcelles saines, la protection peut être stoppée.**

\* Spécialités à base de soufre, Microthiol Spécial Disperss, Sulforix LS, Citrothiol DG et autres spécialités ; soufre mouillable ; 12,5kg/ha (dose homologuée), 6kg/ha (dose conseillée) ; Héliosoufre, soufre mouillable, 7,5L/ha (dose homologuée), 5L/ha (dose conseillée).

**Attention aux risque de brûlures si les températures sont supérieure à 30°C.**

Le nombre d'application maximum est de 12 pour Héliosoufre, elle est de 8 pour les autres spécialités à base de soufre.

\* Fluidosoufre pour poudrage, soufre, 25kg/ha (dose homologuée), 15 à 20kg/ha (dose conseillée), (3 applications max) .

**Les conditions actuelles sont propices à un poudrage. Toutefois attention au risque de brûlures. Lors du poudrage les températures doivent être inférieures à 25°C.**

**A retenir**

Fin de la protection sur les parcelles saines.

## VERS de la GRAPPE

## Analyse de risque

**Observations**

Eudemis : Le vol est terminé. Des perforations sont observées en tous secteurs.  
Eulia: Le vol est terminé.



*Eudemis, perforation + larve agée*

**Analyse de risque**

La gestion de la G3 s'anticipe en effectuant un comptage des perforations en fin de G2.

**Le seuil de nuisibilité est de 10 perforations pour 100 grappes.**  
(Avec la confusion, le seuil est de 5 perforations pour 100 grappes).

## Préconisations

Il est trop tard pour intervenir sur la G2. La gestion de la G3 sera raisonnée en fonction du nombre de perforations dénombrées en fin de G2 (si le seuil de nuisibilité est atteint).

Pour les piègeurs, pensez à changer les capsules de phéromones.

**Alternatives**

La confusion est une méthode biocontrôle.

**A retenir**

Prévoir un comptage des perforations.

## CICADELLES VERTES

## Analyse de risque

**Observations**

Le nombre de larves est en légère augmentation et de nombreux adultes volent dans les parcelles. Les grillures progressent sur les cépages sensibles.

**Analyse de risque**

Ce sont les larves qui sont à l'origine des dégâts de grillure. La gestion du ravageur repose sur une surveillance des populations larvaires.



*Grillures sur Merlot*

## Préconisations

**Surveillez vos parcelles, les interventions sont à réaliser dès l'apparition des jeunes larves.**

La gestion de ce ravageur peut être couplée avec les traitements obligatoires contre le vecteur de la flavescence dorée.

Les populations de cicadelles sont gérées par des applications d'argiles:

\*Sokalcjarbo wp, Baikal kaolin, 10kg/ha (4 applications max)

\*Argibio, Kaolinite, 10kg/ha (produit normé NFU engrais)

**Alternatives:**

Les applications à base d'argile sont des produits de biocontrôle.

**A retenir**

Surveillez vos parcelles.

## FLAVESCENCE DOREE

## Analyse de risque

**Observations**

Des larves au stade L4-L5 sont observées sur le vignoble et des symptômes sont visibles.



*Flavescence dorée sur Gamay*

**Observez vos parcelles et coupez les pieds qui présentent des symptômes.**

## Préconisations

**Les dates de traitement ont été fixées par la DRAAF. Le T1 et le T2 sont terminés. Le T3 est soumis à l'analyse de risque, il est à réaliser 10 jours après le T2 (du 27 juin au 9 juillet).**

Le T3, est conseillé sur les parcelles les plus à risque, c'est à dire celles avec présence de pieds contaminés lors de la prospection 2021, les parcelles situées dans l'environnement proche de friches de vigne et celles à proximité de foyers détectés.

Des traitements réalisés groupés entre vignerons d'un même secteur permettront d'améliorer l'efficacité.

\* Pyrevert, pyrèthrine (naturelles) 1,5L/ha (3 applications max), ZNT= 50m

**Attention:** épamprer les parcelles avant de traiter, pour que les larves soient présentes dans la végétation et touchées par le traitement.

**A retenir**

T3 entre le 27 juin et 9 juillet.



## MESURES AGRO-ÉCOLOGIQUES

**Les bandes enherbées: bénéfiques pour l'environnement et intérêts agronomiques**

La conditionnalité des aides de la PAC généralise aujourd'hui l'implantation de bandes enherbées en bordure de cours d'eau. De tels dispositifs peuvent également être implantés sur des zones sensibles au ruissellement, aux dérives de produits phytosanitaires et afin de favoriser la biodiversité.

Les bandes enherbées constituent des structures linéaires fixes, semi-naturelles, entretenues et restant en place plusieurs années.

**Effets bénéfiques des bandes enherbées:****\* Prévenir l'érosion et le ruissellement:**


Sur les parcelles en pente, les bandes enherbées permettent de ralentir le ruissellement, stabilisent le sol et favorisent les dépôts de particules. La fertilité du sol est améliorée grâce à l'enrichissement en vers de terre. Elles ont également un intérêt, au niveau des zones peu productives, comme les affleurements calcaires et les hauts de côtes, sur lesquelles implanter une culture annuelle est parfois peu rentable.

**\* Prévenir la pollution des eaux:**

La bande enherbée en bordure des cours d'eau, fixe une partie des limons chargés en engrais et produits phytosanitaires et capte les éventuelles dérives des pulvérisateurs.

L'activité biologique intense au sein de la bande enherbée, dégrade aussi une partie des intrants.

Une bande enherbée de 5m permet de réduire la largeur de la zone de non traitement (ZNT), de 20 mètres à 5 mètres ou de 50 mètres à 5 mètres, le long d'un cours d'eau. Cette réduction n'est possible qu'à condition d'enregistrer ses pratiques de traitements et pour les grandes cultures d'équiper son pulvérisateur d'un système anti-dérive. En vigne, il faut que le pulvérisateur soit homologué et une haie doit être présente entre la parcelle et le cours d'eau.

**\* Favoriser la biodiversité et valoriser le paysage:**

Les bandes enherbées sont des zones de régulation écologique, elles servent de refuge à la biodiversité. Elles ont aussi un rôle dans la valorisation des paysages et l'image de l'agriculture.

L'installation de bandes enherbées favorise la circulation des auxiliaires et des pollinisateurs. Elles sont une zone de refuge et d'alimentation pour la faune sauvage, elles permettent également de limiter les dégâts de gibier.

**Implantation et entretien des couverts:**

Le couvert de la bande enherbée peut être composé par la flore spontanée ou semée. Lorsqu'il est semé, un mélange d'espèces est à privilégier. Dans le cadre de la conditionnalité des aides PAC, les légumineuses pures sont interdites. La végétation spontanée permet d'avoir une flore adaptée et facile à gérer.

L'entretien se fera par fauche ou broyage une fois par an, afin de favoriser la régénération du couvert. Il faudra éviter les périodes de reproduction de la faune sauvage (entre le 15 mai et le 23 juin).

**La déclaration PAC:**

Dès lors qu'elles sont rattachées à une parcelle en terre arable, les bandes enherbées sont admissibles aux aides de la PAC. Il doit être possible de les distinguer facilement de la culture adjacente. Les bandes enherbées comptabilisées comme SIE (Surfaces d'Intérêt Ecologiques) sont:


\* les bandes tampons le long des cours d'eau.

\* les bordures de champs entre deux parcelles.

\* bordures de champs en lisière de forêt.

Il est également possible de déclarer la bande enherbée en jachère.

Source : "Tout savoir sur les bandes enherbées", Chambre d'Agriculture du Tarn et Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn.



## DIVERS

**Botrytis :**

Des symptômes sont signalés sur Gamay, Chardonnay, Loin de l'oeil et Merlot. Ils peuvent être liés à une attaque de black-rot, à la présence de perforations ou à des blessures.

Mettre en oeuvre la prophylaxie: maîtriser la vigueur, aérer les grappes, effeuiller et gérer le risque vers de la grappe et oïdium. L'effeuillage, favorise l'aération des grappes et permet d'éviter que l'humidité ne reste au niveau des baies. Il doit être réalisé côté soleil levant pour éviter les risques de brûlures.



Botrytis sur grappe, Gamay

## Prochain bulletin le 19 juillet

Pensez à utiliser les équipements de protection appropriés pour chaque traitement

La liste des mesures alternatives sur : [https://tarn.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user\\_upload/Occitanie/074\\_Inst-Tarn/1-PRODUCTIONS\\_TECHNIQUES/Viticulture/Documents\\_techniques/Protection\\_vignoble/doc\\_alternatives\\_cepp\\_viti\\_12\\_04\\_2022.pdf](https://tarn.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/074_Inst-Tarn/1-PRODUCTIONS_TECHNIQUES/Viticulture/Documents_techniques/Protection_vignoble/doc_alternatives_cepp_viti_12_04_2022.pdf)



Action cofinancée par le Fond Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) et l'agence de l'Eau Adour Garonne - L'Europe investit dans les zones rurales

Ce bulletin fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique du Tarn. Il s'appuie sur le réseau d'observation des vignes réparti sur cette même zone géographique. Il est réalisé à l'aide de modèles validés (mildiou), d'autres en cours de validation (oïdium) qui tiennent compte des prévisions météorologiques. Ce bulletin technique s'appuie sur l'analyse de risque du dernier BSV consultable sur les sites internet de la DRAAF Occitanie (<http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr>) et de la CRA Occitanie ([www.occitanie.chambre-agriculture.fr](http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr)). Sauf mention spécifique, les préconisations s'appliquent à l'ensemble de ce territoire et le traitement portera sur l'ensemble de la parcelle. Respectez les conditions d'utilisation des produits phytosanitaires et assurez-vous du respect des bonnes pratiques. Les produits cités peuvent être trouvés sur le site internet e-phy : <http://ephy.anses.fr>. Les préconisations de ce bulletin ne peuvent en aucun cas se substituer à l'observation de la parcelle. L'agriculteur demeure responsable de ses décisions et de ses interventions. Il est particulièrement important de bien lire l'étiquette avant toute manipulation (voir la fiche Bonnes pratiques d'utilisation des produits phytos). N'utilisez que des produits phytosanitaires autorisés par vos éventuels cahiers de charges spécifiques.

La Chambre d'agriculture du Tarn est titulaire d'un contrat d'assurance n°07011424 - 2128 av 02 garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de conseil indépendant en préconisations phytopharmaceutiques.

La Chambre d'agriculture du Tarn est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Siège social : 96 rue des agriculteurs  
BP 89 – 81003 ALBI Cedex  
Tél.: 05 63 48 83 43 - Fax: 05 63 48 83 09  
Email : [accueil@tarn.chambagri.fr](mailto:accueil@tarn.chambagri.fr)  
Rédigé par : Virginie VIGUES, Thierry MASSOL,  
Marie Laure MURATET  
[v.vigues@tarn.chambagri.fr](mailto:v.vigues@tarn.chambagri.fr) – 06.68.91.10.73  
[t.massol@tarn.chambagri.fr](mailto:t.massol@tarn.chambagri.fr) – 06.69.08.07.81  
[ml.muratet@tarn.chambagri.fr](mailto:ml.muratet@tarn.chambagri.fr) – 06.69.32.70.75

